

ТЕСТ №1
по ендокринология

- 1. Принципът на отрицателната обратна връзка в ендокринологията означава, че повишеното ниво на хормон, секретирани от периферна ендокринна жлеза довежда до:**
 - а) функционално стимулиране на хипоталамуса
 - б) функционално супресирание на хипоталамуса
 - в) потискане функцията на самия ендокринен орган
- 2. При акромегалия може да се установи:**
 - а) повишено ниво на СТХ и пролактин
 - б) повишено ниво на СТХ и ТТХ
 - в) повишено ниво на СТХ, което не се съчетава с повишение на други хормони
- 3. Лечение с бромокриптин се провежда при:**
 - а) хипопрولاктинемия.
 - б) хиперпрولاктинемия.
 - в) хипофизарен хипотироидизъм
- 4. За диагностициране на безвкусен диабет се провежда:**
 - а) тест с жадуване
 - б) орален глюкозотолерансен тест
 - в) супресионен тест с дексаметазон
- 5. Основен етиологичен фактор за развитие на ендемичната струма е :**
 - а) прием на храни със струмигенен ефект
 - б) недоимък на йод в околната среда
 - в) ендогенни фактори
 - г) антитела срещу тиреоидната пероксидаза
- 6. Покачването на серумния холестерол при заместително лечение на хипотироидизъм е проява на:**
 - а) предозиране на медикамента
 - б) недостатъчна дозировка
- 7. При първичен хипотироидизъм има следните клинични прояви:**
 - а) брадикардия, сомнолентност
 - б) повишено окосмяване
 - в) обстипация
 - г) брадикардия
 - д) студена, едематозна кожа
 - е) тахикардия
- 8. Първичният хиперпаратироидизъм има следните основни клинични форми:**
 - а) само бъбречна
 - б) само костна
 - в) костна и бъбречна
 - г) нито една от горните форми
- 9. Диагнозата захарен диабет се поставя, когато кръвната захар на гладно е :**
 - а) $\geq 7.0 \text{ mmol/l}$
 - б) $\geq 8.0 \text{ mmol/l}$
 - в) $\geq 6.0 \text{ mmol/l}$
- 10. Диабетната нефропатия /ДН/ се характеризира със следната патоморфология:**
 - а) реномегалия с гломерулна хипертрофия
 - б) мезангиална пролиферация с увеличение на мезангиалния матрикс
 - в) задебеляване на гломерулната базална мембрана
 - г) 1, 2 и 3