

ТЕСТ №5
по ендокринология

- 1. При акромегалия се срещат най-често следните симптоми:**
 - а) гинекомастия и галакторея
 - б) деформация и увеличение на турското седло
 - в) хиперхидроза
 - г) редукция на тегло
- 2. За диагностициране на безвкусен диабет се провежда:**
 - а) тест с жадуване
 - б) орален глюкозотолерансен тест
 - в) супресионен тест с дексаметазон
- 3. Субклиничен хипотиреоидизъм имаме при следната параклинична констелация:**
 - а) нормални стойности на св.Т3 и св.Т4 при потиснат ТСХ
 - б) нормални стойности на св.Т3 и св.Т4 при повишен ТСХ
 - в) повишени стойности на св.Т3 и св.Т4 при потиснат ТСХ
- 4. Тиреотоксикоза има при следните тиреоидни заболявания:**
 - а) подостър тиреоидит
 - б) Базедова болест
 - в) спорадична гуша
 - г) струма на Marine-Lenhart
- 5. При наличие на тиреоиден карцином състоянието обикновено е:**
 - а) хипотиреоидно
 - б) еутиреоидно
 - в) хипертиреоидно
- 6. Паратиреоидният хормон въздейства директно върху:**
 - а) черва и бъбреци
 - б) черва, бъбреци и кости
 - в) бъбреци и кости
 - г) черва, бъбреци и кожа
- 7. За изява на захарен диабет тип 2 е необходимо да е налице:**
 - а) инсулинова резистентност
 - б) нарушена секреторна β -клетъчна функция
 - в) и двете заедно
- 8. Колко процента от дневните калорийни нужди трябва да осигуряват въглехидратите при пациентите със захарен диабет?**
 - а) под 10 %
 - б) 10-15 %
 - в) 25-30 %
 - г) до 40 %
 - д) 55-60 %
 - е) 60–65%
 - ж) процентът е индивидуален, не съществуват нормативи
- 9. Типични симптоми на хипералдостеронизма са:**
 - а) хипертония
 - б) хипотония
 - в) меланодермия
 - г) пруритус
- 10. ВНКХ е резултат от ензимен дефект в:**
 - а) стероидогенезата
 - б) липидния метаболизъм
 - в) цикъла на Кребс
 - г) калциево-фосфорната обмяна